

Barnvaccinationer

Nationellt vaccinationsschema för barnhälsovården

Ålder	6–8 v	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5–6 år
Vaccination						
Rotavirus*	I RotaTeq	II RotaTeq	III RotaTeq			
Difteri		I Hexyon Vaxneuvance	II Hexyon Vaxneuvance	III Hexyon Vaxneuvance		IV Tetravac
Stelkramp						
Kikhosta						
Polio						
Hib						
Hep B**		Vaxneuvance	Vaxneuvance	Vaxneuvance		
Pneumokocker						
Mässling						
Påssjuka					I M-M-R- VAXPRO	
Röda hund						

* Enligt politiskt beslut erbjuds kostnadsfri vaccinering mot rotavirus till alla barn i Sörmland fr o m 1 januari 2018.

** Enligt politiskt beslut erbjuds kostnadsfri vaccinering hepatit B till alla barn i Sörmland födda fr o m 1 oktober 2011.

Dessutom BCG till barn med ökad risk för tuberkulos, från 6 veckors ålder. Kompletterande vaccination rekommenderas bara upp till 6 års ålder (så länge barnet är inskrivet på BVC).

Svenska barnvaccinationsprogrammet rekommenderar enbart kombinationsvaccin enligt vaccinationsschemat, dvs. inte uppdelade vacciner, om inte särskilda medicinska skäl finns. Egna kombinationer av olika vacciner i samma spruta får **aldrig** göras. När flera vaccininjektioner ges vid samma tillfälle ska olika vaccinationsställen användas, t.ex. höger och vänster ben.

Behörighet att ordinera och vaccinera

Sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera och genomföra vaccinering utifrån gällande föreskrifter och inom nedan angivna åldrar och intervall. Om ett barn pga. inflyttning, sjukdom eller annat kommer ”för sent” till första dosen kan man alltid börja serien senare, med intervall såsom i ordinarie schema. Längsta intervall mellan doser är numera borttaget.

Vaccin	Lägsta ålder	Kortaste intervall mellan dos			
		1 och 2	2 och 3	3 och 4	4 och 5
RotaTeq	6 veckor	4 veckor	4 veckor		
Difteri, stelkramp, kikhosta	2,5 månader	6 veckor	6 månader	3 år	5 år
Polio	2,5 månader	6 veckor	6 månader	3 år	
Haemophilus infl. typ B	2,5 månader	6 veckor	6 månader		
Hepatit B	2,5 månader	6 veckor	6 månader		
Pneumokocker	2,5 månader	6 veckor	6 månader		
Mässling, påssjuka, röda hund	12 månader	4 veckor			

Läkarordinationer

Ordination av läkare krävs vid tidigarelagd vaccination inför utlandsresa och vid kompletteringsvaccination för inflyttade där det uppstår avvikelser från rekommenderat innehåll, intervall och lägsta åldrar.

Tidigare start respektive kortade intervall

Vid tidigarelagd grundvaccination (normalt två doser vid 3 och 5 månader) behövs en tredje dos i primärvaccinationen. Vid tidsbrist t.ex. inför en utlandsresa kan intervallen kortas. Tumregler för detta återfinns i Rikshandboken.

Extrados MPR

Sedan 2015-01-01 erbjuds alla 6–12 månader gamla barn i Sörmland, efter läkarordination, en kostnadsfri extrados mot mässling-påssjuka-röda hund inför utlandsresa. Dessa barn ska ha sin ordinarie MPR-dos vid 18 månaders ålder för ett adekvat långtidsskydd fram till elevhälsans boosterdos av MPR.

Vilka vacciner kan ges samtidigt?

Se Rikshandbokens nationella riktlinjer.

Dokumentation

Utförd vaccination ska antecknas på avsedd plats i BHV-journalen och på barnets vaccinationskort/hälsobok. Kom ihåg! Vaccination ska inte skrivas in/signeras i journalen förrän den verkligen är given! Överföring av dokumentation från PMO till MittVaccin sker automatiskt.

Rapport av biverkningar

Mindre vanliga och sällsynta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket
<http://www.lakemedelsverket.se/rapportera> (länkar till blanketter finns via webbsidans högermarginal).