

Beställning av barnvaccin i Region Sörmland

Enligt gällande avtal ingår följande vacciner i vaccinationsprogrammet på BVC.

| Ålder | Vaccin mot | Preparat | Tillverkare |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 6–8 veckor | Rotavirus | RotaTeq* | MSD |
| 3 månader | Rotavirus | RotaTeq* | MSD |
| | DTP, polio, Hib, Hep B | Hexyon** | Sanofi |
| | Pneumokocker | Vaxneuvance | MSD |
| 5 månader | Rotavirus | RotaTeq* | MSD |
| | DTP, polio, Hib, Hep B | Hexyon** | Sanofi |
| | Pneumokocker | Vaxneuvance | MSD |
| 12 månader | DTP, polio, Hib, Hep B | Hexyon** | Sanofi |
| | Pneumokocker | Vaxneuvance | MSD |
| 18 månader | Mässling, röda hund, påssjuka | M-M-RVAXPRO | MSD |
| 5–6 år | DTP, polio | Tetravac | Sanofi |
| Vid behov från 6 v | BCG | BCG-vaccin AJVaccines | Scandinavian Biopharma |

* Fr.o.m. 2018-01-01 erbjuds alla barn åldern 6–16 veckor i Sörmland rotavirusvaccin (enligt politiskt beslut i Sörmland). Fr.o.m. 2019-09-01 ingår detta i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

** Från 2019-09-01

Används på BVC för att vaccinera upp barn

| Vaccin mot | Preparat | Tillverkare |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Hepatit B | Engerix B | Glaxo Smith Kline |
| Pneumokocker | Prevenar 13 | Pfizer |
| Hib (Influensa) | Act-HIB | Sanofi |

Beställning och kundservice:

Beställning ska alltid göras i Visma Proceedo och som reservrutin via fax eller e-post till sjukhusapoteket. Mer information finns under läkemedelsförsörjning på Insidan eller på Samverkanswebben.

Leveranser:

Leveranstiderna är de samma som för ordinarie läkemedelsbeställningar från sjukhusapoteket. Mer information finns under läkemedelsförsörjning på Insidan eller på Samverkanswebben.

Hantering:

- Vaccinet ska förvaras i 2–8 °C och får inte frysas (se hållbarhet nedan).
- För att undvika förväxling, förvaras alltid sprutor och ampuller i sin originalkartong, om möjligt på olika hyllor i kylskåpet!
- Alla vacciner är ljuskänsliga och ska förvaras i yttkartongen.
- För att behålla sin effekt ska alla vacciner tas ut ur kylskåpet och blandas till i direkt anslutning till vaccinationen.

Hållbarhet:

Maximalt till utgångsdatum samt i lagringstemperatur enligt nedan.

| Vaccin mot... | Lagringstemperatur °C* | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | 2–8 °C | 20–25 °C | 37 °C |
| Hepatit B | 2 år | Max 1 månad | Max 1 vecka |
| Tetanus, difteri | Cirka 2 år | Cirka 6 månader | Veckor |
| Pertussis | Cirka 2 år | 2 veckor | - |
| Polio (inaktiverat) | 2 år | 2 veckor | - |
| MPR | 2 år | 1 månad | 1 vecka |
| BCG | 1 år | 1–2 veckor | - |

*Personlig uppgift om hållbarhet för olika vaccin från Helena Hervius Askling 2019