


## Prolongerad neonatal ikterus

Ikterus är vanligt förekommande hos friska nyfödda barn upp till 2 veckors ålder. Kvarvarande (prolongerad) ikterus hos barn äldre än 2 veckor behöver utredas. Senast vid 3 veckors ålder är det viktigt att initiera blodprovstagning för bestämning av totalt och konjugerat bilirubin, för att utesluta kolestas.

Det är viktigt att fråga efter, och helst själv, inspektera färgen på barnets avföring. Kolestas ska misstänkas vid prolongerad ikterus hos barn med eller utan avfärgad avföring. Avfärgad avföring (se internationella bildskalor enligt länk i Rikshandboken) hos ett ikteriskt barn ökar sannolikheten för kolestas. Enbart avfärgad avföring kan i sig föranleda ytterligare utredning.



Ett barn med prolongerad neonatal ikterus hänvisas till barnkliniken för provtagning. Vid nedsatt allmäntillstånd och/eller vikttnedgång hänvisas barnet till barnkliniken akut. Om barnet i övrigt är välmående kontaktas barnkliniken enligt nedan:

### Mälarsjukhuset:

Kontakt tas med barnbakjour, telefon: 0703-37 04 71, som ordinerar provtagning.

Barnbakjouren meddelar provtagningssköterska som ringer föräldrarna för tid på provtagningen inestående eller nästkommande dag. Ordinerande läkare meddelar familjen provsvar.

### Kullbergska sjukhuset:

Kontakt tas med barnmottagningen, internnummer: 563 99, externnummer: 0150-564 60.

Mottagningssköterska ringer föräldrarna för tid på provtagningen inestående eller nästkommande dag. Tjänstgörande läkare ordinerar provtagning. Ordinerande läkare meddelar familjen provsvar.

### Nyköpings lasarett:

Kontakt tas med barnmottagningens rådgivning, telefon: 0155-24 51 00, knappval 9 (VIP-val som inte läses upp i telefonsvararen). Lämna dina (BVC:s) kontaktuppgifter på telefonsvararen.

Rådgivningssköterska prioriterar samtalet och ringer tillbaka inom kort. Barnmottagningen kontakter sedan föräldrarna för provtagningstid närmsta dygnet. Barnbakjouren ordinerar och följer upp provsvar.